

急性中耳炎のスコアリング

症状スコア

耳痛/啼泣・不機嫌

0:なし
1:軽度(我慢できる/食欲あり)
3:重度(鎮痛剤要/食欲無し)

発熱

0:37 以下 1:37.1 -37.9 3:38 以上

- 発熱において平熱が37.0 以上の場合には、以下の様に判定する。
平熱 + 1.1 以上(2)、平熱 + 1.0 以下(1)、平熱(0)

鼓膜スコア

膨隆/耳漏

0:なし
2:軽度(鼓膜の一部の膨隆)/少量(鼓膜周囲に耳漏あり)
4:高度(鼓膜全体の膨隆)/中等量以上(外耳道の入り口まで耳漏あり)

発赤 / 黄変:

0:なし 1:軽度(鼓膜の一部) 2:高度(鼓膜全体)

鼓膜の膨隆は中耳内の炎症性貯留液の存在を示すので最も高いスコアをつける

急性中耳炎の重症度判定

症状スコア

鼓膜スコア

	0	1	2	3	4	5	6
1		軽症					
2							
3					中等症		
4							
5							
6				重症			

最終判定: スコアリングによる重症度判定とリスクファクターを組み合わせる

例: 軽症でリスクファクターなし 軽症(-)
重症でリスクファクターあり 重症(+)

急性鼻副鼻腔炎のスコアリング

症状スコア(全身徴候または症状)

鼻漏:

0:なし

1:少量(1日1 - 5回鼻をかむ)

3:中等量以上(1日6回以上鼻をかむ)

発熱

0:37 以下

1:37.1 -37.9

3:38 以上

湿性咳嗽(小児)

0:なし

1:軽度(時々咳をする)

3:高度(頻繁に咳をする)

顔面痛、前頭部痛(成人)

0:なし

1:軽度(我慢できる)

3:高度(鎮痛剤が必要なほど)

鼻スコア

鼻汁の性状と量

1. 粘膿性鼻汁または後鼻漏:

0:なし

2:少量(鼻汁が鼻腔に少量、咽頭後壁に後鼻漏の付着あり)

4:中等量以上(鼻汁を鼻腔入り口に認める、咽頭後壁に後鼻漏の落下を認める)

2. 漿液性鼻汁または後鼻漏: 0:なし 1:少量 2:中等量以上

鼻粘膜の腫脹(鼻腔が腫れて狭い):

0:なし

1:軽度(鼻はある程度通っている)

2:高度(鼻がほとんど詰まっている)

粘膜の発赤:

0:なし

1:あり

粘膿性の鼻汁や後鼻漏は細菌感染を示すので、もっとも高いスコアをつける

急性鼻副鼻腔炎の重症度判定

症状スコア

	0	1	2	3	4	5	6
鼻内スコア	0						
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						

軽症

中等症

重症

最終判定: スコアリングによる重症度判定とリスクファクターを組み合わせる

例: 軽症でリスクファクターなし 軽症(-)

重症でリスクファクターあり 重症(+)